

ARPON

Cipermetrina 100 mg/ml



FORMATOS DISPONIBLES



ECTOPARASITICIDA CONCENTRADO PARA EMULSIÓN







ARPON, 100 mg/mi concentrado para emulsión para pulverización cutánea para bovino y caballos.

ESPECIES DE DESTINO: Bovino.

Caballos no destinados a consumo humano.

INDICACIONES DE USO, ESPECIFICANDO LAS ESPECIES DE DESTINO:

Control de las parasitosis externas producidas por:

Bovino y caballos: moscas (Haematobia irritans, Musca autumnalis, Hydrotaea irritans).

Bovino: piojos (Linognathus spp., Haematopinus).

COMPOSICIÓN:.

Sustancia activa: **Cipermetrina (45:55) 100 mg** Excipientes, c.s.





Cipermetrina 100 mg/ml

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Uso cutáneo. Se emplea en forma de pulverización previa dilución.

<u>Bovino y equino.</u> Control de moscas: Pulverizar al inicio de la estación de las moscas y repetir cada mes en caso necesario.En caso de una excesiva abundancia de moscas de los cuernos y moscas de la cara, pulverizar cada 15 días. Control de piojos: Rociar todo el cuerpo del animal cuando sé observen piojos. En caso necesario, repetir la pulverización con un intervalo mínimo de 14 días.

Para el control de moscas y piojos preparar la emulsión para pulverización diluyendo 1 ml de medicamento en 100 ml de agua (equivalente a 0.1 g de cipermetrina/100 ml de agua) y aplicar:

- Bóvidos y équidos àdultos: 500 ml.
 Bóvidos jóvenes: 250 ml.
- Terneros y potros: 125 ml.

CONTRAINDICACIONES: No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa y/o a algún excipiente. No tratar animales de menos de 1 mes de edad. Tratar a los animales jóvenes por separado.

ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE DE DESTINO: No usar en équidos cuya carne o leche se destine a consumo humano. No tratar a los animales con heridas o llagas abiertas. No debe administrarse el medicamento cuando exista amenaza de lluvia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:

Precauciones especiales para su uso en animales; Utilizar el medicamento en un ambiente bien ventilado, evitando el contacto con los ojos del animal. No utilizarlo dentro de la zona de ordeño o donde pueda originarse contaminación del agua. No tratar a los animales sedientos, hambrientos o cansados.

Precauciones especificas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales. Las personas con hipersensibilidad conocida a la cipermetrina o a alguno de los excipientes deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. Este medicamento debe administrarse con precaución para minimizar la exposición durante el manejo de la emulsión concentrada, de la emulsión para pulverización y de los animales tratados. En caso de padecer problemas respiratorios o si se ha presentado malestar persistente tras la manipulación de otros piretroides, consultar con el médico antes de usar el medicamento. Usar un equipo de protección personal consistente en gafas, mascarillas, ropa protectoras, guantes (de nitrilo desechables) y botas de goma al manipular el medicamento concentrado, la solución de pulverización y los animales recién tratados. Evitar el contacto con la piel, los ojos y las mucosas. En caso de derrame sobre la piel o contacto accidental, lavar inmediatamente con agua abundante. Si aparece irritación, consulte a un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lávese con agua y jabón las manos, cara y piel expuestas al abandonar el área de trabajo.

El tratamiento debe realizarse en recintos bien ventilados o al aire libre. No inhalar los vapores. Cuando se pulverice en un recinto cerrado, utilizar una mascarilla de protección FFP3. Cuando se traten animales fuera del establo, no pulverizar contra el viento. No pulverizar en presencia de personas no protegidas. No comer, beber ni fumar mientras se utilice el medicamento veterinario.

En la medida de lo posible reduzca el contacto con los animales tratados. Se debe evitar el contacto directo con los animales hasta que estén completamente secos. Utilizar

siempre guantes protectores y lavar las manos y piel expuesta con agua y jabón abundante tras el contacto con ellos.

Al facultativo: Este medicamento contiene cipermetrina. La cipermetrina puede producir sensibilización cutánea e inducir parestesia o hiperestesia tras la exposición dérmica. Es irritante para la piel y los ojos.

Otras precauciones: Comó medida de precaución los animales deben mantenerse alejados de los cursos de agua al menos durante 12 horas después del tratamiento (ver apartado propiedades medioambientales de la etiqueta-prospecto). No pueden descartarse efectos a largo plazo sobre los insectos coprófagos tras el uso continuado o repetido de ectoparasiticidas piretroides. Por tanto, el tratamiento repetido con medicamentos piretroides en animales de un mismo pasto, en una misma estación, sólo debe realizarse en ausencia de tratamientos alternativos y de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuado por el veterinario responsable.

REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y GRAVEDAD): Ninguna conocida.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: No existen contraindicaciones durante estos periodos.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Ninguna conocida.

SOBREDOSIFICACIÓN (SÍNTOMAS, MEDIDAS DE URGENCIA, ANTÍDOTOS), EN CASO NECESARIO: El modo de empleo hace improbable una intoxicación por sobredosificación. En caso de ingestión oral masiva aparece excitación y convulsiones que progresan a parálisis y fibrilación muscular, pudiendo llegar a producir la muerte por insuficiencia respiratoria. Generalmente no es necesario un tratamiento tras la ingestión. Pudiendo administrarse catárticos salinos o una suspensión de carbón inactivado. Impedir la ingestión de aceites y grasas que favorecen la absorción a nivel intestinal.

TIEMPOS DE ESPERA:

Carne: 4 días, Leche: No administrar a animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano. Caballos: No procede. No usar en équidos cuya carne o leche se destine al consumo humano.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO: EXTREMADAMENTE PELIGROSO para peces y organismos acuáticos. Evitar que el envase vacío o sus residuos, incluidos los de la solución de pulverización, entren en contacto con cursos de agua. No contaminar charcas, vías fluviales o acequias con el producto o sus envases vacíos.

No quemarlo ya que su combustión produce gases tóxicos.

Todo medicamento veterinario no utilizado lo o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 601 ESP

PROHIBICIÓN DE VENTA, DISPENSACIÓN Y/O USO:

Condiciones de dispensación: Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Condiciones de administración: Administración bajo control o supervisión del veterinario.

EN CASO DE DUDA CONSULTE A SU VETERINARIO.









TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:

Laboratorios Zotal S.L.U.

Ctra. Nacional 630, km. 809. 41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA

Tel.: +34 954 390 204

Email: zotal@zotal.com www.zotal.com

INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297

