


ZOTAL[®]
— LABORATORIOS —

ZOOVECA[®]

Dimpilato 150 mg/ml



FORMATOS DISPONIBLES



— USO VETERINARIO —

ECTOPARASITICIDA ANTISÁRNICO INSECTICIDA



SARNA



GARRAPATAS



PULGAS

ZOOVECA 150 mg/ml CONCENTRADO PARA EMULSIÓN
PARA PULVERIZACIÓN CUTÁNEA.

ESPECIES DE DESTINO: Ovino.

INDICACIONES DE USO, ESPECIFICANDO LAS ESPECIES DE DESTINO:

Ovino: Tratamiento de las infestaciones producidas por:
- Larvas de moscas (*Lucilia spp.*, *Phormia spp.*, *Calliphora spp.*)
- Melophagus ovinus
- Piojos (*Bovicola spp.*, *Lignonathus spp.*, *Damanilla spp.*)
- Garrapatas (*Ixodes ricinus*)
- Ácaros (*Psoroptes ovis*, *Chorioptes bovis*, *Sarcoptes scabiei*).

COMPOSICIÓN:

Cada ml contiene:
Sustancia activa: **Dimpilato 150 mg**
Excipientes, c.s.



La eficacia que necesitas.

ZOOVECA®

Dimpilato 150 mg/ml

MEDICAMENTOS VETERINARIOS

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Uso cutáneo (pulverización).
La cantidad de producto a utilizar se debe mezclar previamente con una pequeña cantidad de agua, agitando y diluyendo después a volumen.

Pulverizar con una solución de 625 mg de dimpilato/l de agua (equivalente a 50 ml de medicamento/12 litros de agua).

Para infestaciones por ácaros se recomienda que la emulsión quede bien en contacto con la piel del animal, que quede completamente mojada. Se aplicará el medicamento incluyendo una pulverización en cada oído.

Para infestaciones por garrapatas se recomienda tratar las ovejas en primavera, antes de la paridera. Si la infestación es grave, repetir el tratamiento 6 semanas después.

CONTRAINDICACIONES: No usar en animales enfermos, convalecientes, débiles, exhaustos o sedientos.

No usar en casos de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa y/o a alguno de los excipientes.

No usar en animales con heridas o lesiones abiertas.

No usar en animales de menos de 4 semanas de edad.

ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE DE DESTINO: No administrar a hembras en lactación cuya leche se destine al consumo humano.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:

Precauciones especiales para su uso en animales: No tratar a los animales inmediatamente después de comer.

No tratar a las ovejas con menos de 2 semanas de crecimiento de la lana.

No tratar a las ovejas cuando el tiempo sea húmedo y tormentoso; si hace frío o calor extremos, ni cuando la lana está mojada.

Dejar descansar a los animales durante 2 a 3 horas antes del tratamiento.

Hay que tener cuidado para que los animales no traguen o inhalen cualquier lavado.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: En la medida de lo posible reduzca el contacto con los animales tratados. Se debe evitar el contacto directo con los animales hasta que estén completamente secos. Utilizar siempre guantes protectores y lavar las manos y piel expuesta con agua y jabón abundante tras el contacto con ellos.

Al facultativo: Este medicamento contiene dimpilato. Los síntomas de intoxicación son: sensación de cansancio, debilidad que puede ir acompañada de dolor abdominal, diarrea, sudoración y salivación excesiva hasta 12 horas después de la exposición. La intoxicación grave causa convulsiones musculares generalizadas.

Otras precauciones: No eliminar el producto en aguas continentales ni en terrenos fácilmente encharcables.

REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y GRAVEDAD): Ocasionalmente pueden producirse reacciones de hipersensibilidad cutánea.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: No se han descrito contraindicaciones en estos periodos.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: No administrar con otros inhibidores de la colinesterasa.

No administrar con fármacos depresores del SNC tipo fenotiazinas.

SOBREDOSIFICACIÓN (SÍNTOMAS, MEDIDAS DE URGENCIA, ANTÍDOTOS), EN CASO NECESARIO: El modo de empleo del medicamento hace improbable una intoxicación por sobredosificación. En caso de sobredosis, los síntomas de intoxicación son los típicos de los organofosforados, por inhibición de la colinesterasa (síntomas muscarínicos: hipersalivación, vómitos, diarrea, miosis y lagrimeo; síntomas nicotínicos: temblores y contracciones musculares).
Antídoto: atropina.

TIEMPOS DE ESPERA:

Carne: 24 días.

Leche: No administrar a ovejas en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO: El dimpilato (diazinón) es tóxico para los organismos acuáticos, las aves y las abejas. Evitar que el envase vacío o sus residuos, incluidos los de la solución de pulverización, entren en contacto con los cursos de agua. No contaminar charcas, vías fluviales o acequias con el producto o sus envases vacíos. Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 978 ESP

PROHIBICIÓN DE VENTA, DISPENSACIÓN Y/O USO:

Condiciones de dispensación: Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Condiciones de administración: Administración bajo control o supervisión del veterinario.

EN CASO DE DUDA CONSULTE A SU VETERINARIO.



TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:

Laboratorios Zotal S.L.U.

Ctra. Nacional 630, km. 809.

41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA

Tel.: +34 954 390 204

Email: zotal@zotal.com www.zotal.com

INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297



efr