

ZOTAL
— LABORATORIOS —

ARPON[®]

Hoko[®] Ex[®]

INSECTICIDA LARVICIDA EN GRÁNULOS



LARVAS



MOSCAS



NAVES
GANADERAS

Larvicida con ciromazina, de actuación temprana que interrumpe el ciclo vital del insecto evitando el desarrollo de larva a adulto, reduciendo drásticamente la aparición de moscas por lo que es rentable y efectivo aplicándolo en estadios larvarios. Indicado especialmente para entornos ganaderos, agropecuarios y equinos. Máxima eficacia comprobada contra diferentes especies de mosca (*Musca domestica* y *Stomoxys Calcitrans*).



— USO GANADERO —



La eficacia que necesitas.

ARPON®

Hoko Ex®




COMPOSICIÓN

Ciromazina

20g/kg

FORMATOS DISPONIBLES



5 kg



FT



FDS

YouTube



Para solicitar ficha técnica, ficha de seguridad, ver vídeos demostrativos o más información, escanea este código:

PROPIEDADES:

Arpón Hoko Ex es un insecticida larvicida con eficacia comprobada contra gran variedad de insectos. Se trata de un granulado soluble en agua, especialmente indicado para luchar contra las larvas de las moscas domésticas, moscas de los establos y demás larvas que se desarrollan en el estiércol, el purín y los restos de forraje de las instalaciones ganaderas.

La ciromazina, el componente activo de Arpón Hoko Ex, es un regulador de crecimiento de insectos que pertenece al grupo de los derivados de la triazina. La ciromazina interfiere con el metabolismo de la quitina del insecto por lo que las larvas tratadas no mudarán al estadio siguiente y así el ciclo del insecto será interrumpido. La molécula muestra una alta especificidad para larvas de mosca.

El efecto sobre la población adulta de moscas se hace visible aproximadamente 2 semanas después de la primera aplicación de Arpón Hoko Ex. Usualmente, de dos a cuatro tratamientos al año son suficientes para conseguir tener a la población de insectos bajo control.

DOSIS:

La dosis es:

25 g de Arpón Hoko Ex por m² = 2,5 kg por cada 100 m² = 25 kg por cada 1000 m².

Arpón Hoko Ex puede ser esparcido en seco, vertido o rociado con regadera o con pulverizador. Antes de ser aplicado con pulverizador o en forma de riego Arpón Hoko Ex ha de diluirse en agua. El producto puede aplicarse en presencia de animales siempre que se evite el contacto directo con éstos durante el tratamiento. (No rociar los animales, los abrevaderos ni los comederos).

Dosis y Aplicación:

El producto debe ser aplicado según el grado de humedad de las deyecciones:

- Esparcido en seco:

En caso de deyecciones húmedas, directamente esparcido en gránulo sobre superficie a razón de 25g de producto por cada metro cuadrado

- Con pulverizador:

Para tratar otras superficies o directamente sobre estiércol solidificado. Aplicar 25g por cada metro cuadrado de superficie en un volumen de 1 a 4 Litros de agua.

- Con regadera:

Para tratar otras superficies o directamente sobre estiércol solidificado. Aplicar 25g por cada metro cuadrado de superficie en un volumen de 4 a 10 Litros de agua.

El tratamiento puede repetirse cada 6 semanas o cuando el espesor de la yacija haya aumentado más de 10 cm.

Ejemplos de tratamiento:

- Instalaciones de rumiantes y equinas:

En establos para rumiantes y caballos tratar una franja de unos 50 cm a lo largo de los muros, debajo y al lado de las instalaciones con una regadera o un pulverizador.

En caso de estiércol líquido, los gránulos de Arpón Hoko Ex deben esparcirse directamente.

- Granjas porcinas:

En naves con el suelo totalmente emparrillado, esparcir uniformemente los gránulos por toda la superficie.

En caso de suelo parcialmente emparrillado, el tratamiento se limita a las superficies cubiertas por el emparrillado, así como a las zonas periféricas de los comederos y de las áreas de reposo.

El primer tratamiento debe realizarse preferiblemente, tras retirar el estiércol y antes de introducir a los animales

- Granjas avícolas:

En gallineros con fosos de deyecciones, esparcir directamente los gránulos si el purín es líquido o húmedo.

En gallineros con deyecciones secas es necesario tratar por riego o pulverización toda la superficie.

En granjas de engorde de pollos y pavos, y naves de reproductoras aplicar Arpón Hoko Ex antes de introducir los animales, esparcido en seco, sobre el suelo o tras aplicar la cama.

Repetir el tratamiento en caso de presencia de alphitobius, aplicando bajo la superficie de los bebederos y a lo largo de las paredes laterales, donde habitualmente se acumulan las larvas.

El primer tratamiento debe realizarse tras retirar el estiércol y de nuevo, antes de que el espesor de la nueva capa supere los 10 cm.

LARVICIDA DE USO GANADERO - Reg. Oficial productos Zoosanitarios N° 03035-P

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE USARLO

Laboratorios Zotal S.L.

Ctra. Nacional 630, km. 809.

41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA

Tel.: +34 954 390 204 Fax: +34 954 395 516

Email: zotal@zotal.com



e fr

INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297 www.zotal.com