

ZYNRAT[®]

Bloque 25



RODENTICIDA CON BRODIFACOUM



ZYNRAT BLOQUE 25 es un cebo rodenticida en forma de bloque de parafina listo para su uso que contiene el ingrediente activo anticoagulante, conocido como Brodifacoum, efectivo contra ratón doméstico (*Mus musculus*) y rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), en todas las etapas del desarrollo, activo con una sola ingestión. La cantidad de cebo a colocar depende de la especie diana, rata o ratón y el grado de infestación, por lo que se debe consultar la etiqueta. Para uso doméstico y profesional ganadero. Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los demás miembros de la colonia.

ZYNRAT®


Bloque 25



COMPOSICIÓN

Brodifacoum (CAS N° 56073-10-0)	0,0025%
Excipiente c.s.p.	100%

FORMATOS DISPONIBLES



YouTube



Para solicitar ficha técnica, ficha de seguridad, ver vídeos demostrativos o más información, escanea este código:

CARACTERÍSTICAS:

ZYNRAT BLOQUE 25 es un cebo rodenticida listo para su uso que Brodifacoum, efectivo contra ratón doméstico (*Mus musculus*) y rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), en todas las etapas del desarrollo, activo con una sola ingestión. La formulación consiste en un atractivo bloque de parafina para las especies de roedores indicadas anteriormente. Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los demás miembros de la colonia.

ZYNRAT BLOQUE 25 incorpora una sustancia de sabor amargo (Denatonium Benzoate) para prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

ZYNRAT BLOQUE 25 EN SU USO PROFESIONAL se puede utilizar en interior y alrededor de edificios del entorno de los animales o en las actividades estrechamente relacionadas con su explotación y en SU USO DOMÉSTICO se puede utilizar en interior y alrededor de edificios como casas, bodegas, garajes, almacenes y jardines privados, dentro del entorno de la vida privada.

DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

- Para el control de ratón común (*Mus musculus*) – interior:

20-40 gramos de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros. Los portacebos deben revisarse al menos cada 2 - 3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario.

- Para el control de rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*) – interior y alrededor de edificaciones:

100-200 gramos de cebo por portacebo. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5 metros. Los portacebos deben revisarse a los 5 - 7 días después del comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario.

Para uso alrededor de edificaciones: Proteger los portacebos de las condiciones atmosféricas (ej: lluvia, nieve etc). Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad. Seguir las instrucciones adicionales proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas.

Autorización n° ES/BB(NA)-2018-14-00551

USO NO PROFESIONAL O DOMÉSTICO Y PROFESIONAL GANADERO.

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE USARLO

Laboratorios Zotal S.L.

Ctra. Nacional 630, km. 809,
41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA
Tel.:+34 954 390 204 Fax:+34 954 395 516
Email: zotal@zotal.com



efr

INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297 www.zotal.com