

LIFRONIL

SOLUCIÓN SPOT-ON Fipronilo



INDICACIONES DE USO, ESPECIFICANDO LAS ESPECIES DE DESTINO:
Tratamiento de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides spp.*).

El medicamento veterinario presenta una eficacia insecticida persistente durante 5 semanas frente a pulgas (*Ctenocephalides spp.*).

El medicamento veterinario no ha demostrado un efecto acaricida inmediato frente a garrapatas, pero presenta una eficacia acaricida persistente de hasta 2 semanas frente a *Ixodes ricinus* y de 1 semana frente a *Dermacentor reticulatus* y *Rhipicephalus sanguineus*. Si cuando se aplica el medicamento, el animal ya presenta garrapatas de estas especies es posible que no se eliminen todas en las primeras 48 horas, pero morirán en el plazo de una semana.

El medicamento veterinario puede usarse como parte de la estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas (DAP), siempre que haya sido diagnosticada previamente por un veterinario.

ECTOPARASITICIDA GATOS

LIFRONIL 50 mg SOLUCIÓN SPOT-ON PARA GATOS

ESPECIES DE DESTINO:

Gatos

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:

GATOS

Una pipeta de 0,5 ml contiene:
Sustancia activa: Fipronilo 50 mg

FORMA FARMACÉUTICA

Solución para unción dorsal puntual (spot-on).

FORMATOS:

Caja con 3 pipetas de 0,5 ml en sobres de aluminio individuales.

LIFRONIL

SOLUCIÓN SPOT-ON
Fipronilo

MEDICAMENTOS VETERINARIOS



POSOLÓGIA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía de administración y dosis: Solo para uso externo.

Administrar 1 pipeta de 0,5 ml por animal mediante aplicación tópica en la piel.

Modo de administración: Extraer la pipeta del sobre. Sujetar la pipeta en posición vertical. Dar golpecitos en la parte estrecha de la pipeta para asegurar que su contenido se encuentra en el cuerpo principal. Retirar la punta de la pipeta. Separar el pelo del animal hasta que la piel quede visible. Colocar la punta de la pipeta directamente sobre la piel descubierta del animal y apretarla ligeramente para vaciar su contenido en dos puntos a lo largo del lomo del gato, con preferencia en la base de la cabeza y 2 ó 3 cm más atrás, vaciando aproximadamente la mitad del volumen en cada punto. Apretar la pipeta varias veces para asegurar que la administración se ha realizado completamente.

Es importante asegurarse de que el medicamento veterinario se aplica en una zona en la que el animal no pueda lamerse y que los animales no se laman unos a otros después del tratamiento.

Debe procurarse no humedecer en exceso el pelo del animal con el medicamento ya que esto podría darle un aspecto pegajoso al pelo en la zona de tratamiento. No obstante, si esto ocurriera, desaparecería a las 24 horas después de la aplicación. También se puede observar en el pelo de esa zona la aparición de descamación y depósitos cristalinos durante las 48 horas siguientes a la aplicación.

Pauta de tratamiento: Para un control óptimo de la infestación por pulgas o garrapatas, el programa de tratamiento puede basarse en la situación epidemiológica local. A falta de estudios de seguridad, el intervalo mínimo entre dos tratamientos es de 4 semanas.

CONTRAINDICACIONES:

A falta de datos disponibles, el medicamento veterinario no debe utilizarse en cachorros de gato menores de 2 meses de edad y/o que pesen menos de 1 kg. No utilizar en animales enfermos (enfermedades sistémicas, fiebre...) o convalecientes. No utilizar en conejos ya que pueden producirse reacciones adversas al medicamento e incluso la muerte. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE DE DESTINO:

Las pulgas de los animales domésticos suelen infestar la ceta, la cama y sus zonas de descanso habituales, como las alfombras y el mobiliario tapizado. Por lo tanto, en caso de infestación masiva y al inicio de las medidas de control, estas zonas deben ser tratadas con un insecticida autorizado y aspirarse con regularidad.

El medicamento veterinario no evita que las garrapatas se fijen a los animales. Si el animal ha recibido el tratamiento antes de la exposición a las garrapatas, estas se eliminarán en las primeras 24 a 48 horas después de haberse fijado. Esto ocurre por lo general antes de la ingurgitación, lo cual minimiza, pero no excluye el riesgo de transmisión de enfermedades. Una vez muertas, las garrapatas suelen desprenderse del animal, pero si alguna permanece, puede eliminarse tirando ligeramente de ella.

Es preciso evitar la inmersión del animal en el agua, el baño o el uso de champú de forma frecuente ya que no se dispone de pruebas sobre el mantenimiento de la eficacia del medicamento en estos casos.

Para un control óptimo de los problemas de pulgas en casas con varios animales domésticos, todos los perros y gatos de la casa deben ser tratados con un insecticida autorizado.

Cuando se usa como parte de una estrategia para el tratamiento de la Dermatitis Alérgica por Pulgas se recomiendan aplicaciones mensuales al animal alérgico y a los demás perros y gatos de la casa.

PRECAUCIONES DE USO:

Precauciones especiales para su uso en animales: Evitar el contacto con los ojos del animal. En caso de contacto accidental, lavarlos de inmediato y a fondo con abundante agua. No aplicar el medicamento sobre heridas ni sobre la piel dañada. **Es importante asegurarse de que el medicamento veterinario se aplica en una zona en la que el animal no pueda lamerse y que los animales no se laman unos a otros durante el tratamiento.**

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales: Este medicamento veterinario puede causar irritación ocular y de las mucosas. Por lo tanto, debe evitarse que entre en contacto con la boca o los ojos. En caso de contacto accidental con los ojos, lavarlos de inmediato y a fondo con abundante agua. Si la irritación ocular persiste consultar con un médico y mostrarle el prospecto o la etiqueta. No fumar, beber ni comer durante la aplicación del medicamento. Evitar que el medicamento entre en contacto con la piel. Si esto ocurriera, lavarse las manos con agua y jabón. Lavarse siempre las manos después de manipular el medicamento. Los animales o las personas que manipulen el medicamento y que presenten hipersensibilidad conocida al fipronilo o a cualquiera de los excipientes deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

No se deben tocar los animales tratados hasta que el punto de aplicación del medicamento esté seco y, hasta ese momento, debe mantenerse a los niños alejados de los animales tratados. Por lo tanto, se recomienda no tratar a los animales durante el día y aplicar el medicamento con preferencia al atardecer. Asimismo, debe evitarse que los animales recién tratados duerman con sus propietarios, en particular, con los niños.

Otras precauciones: Este medicamento veterinario contiene alcohol como vehículo que puede causar efectos adversos en superficies pintadas, barnizadas o demás superficies y mobiliario de la casa. Este medicamento es inflamable. Mantener el medicamento alejado de fuentes de calor, chispas, fuego o de cualquier otra fuente de ignición.

REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y GRAVEDAD):

La frecuencia de las reacciones adversas se debe clasificar conforme a los siguientes grupos:

- Muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10 presenta reacciones adversas).
- Frecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 100 animales tratados).
- Infrecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1.000 animales tratados).
- En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10.000 animales tratados).
- En muy raras ocasiones (menos de 1 animal por cada 10.000 animales tratados, incluyendo casos aislados).

Si el animal se lame, puede observarse un breve periodo de hipersalivación que se debe principalmente a la naturaleza del excipiente.

Entre las presuntas y reacciones adversas extremadamente raras que pueden aparecer después de la utilización del medicamento se han descrito reacciones cutáneas transitorias en el punto de aplicación (descamación, alopecia local, prurito y eritema), así como prurito o alopecia generalizados. En casos excepcionales, tras la administración del medicamento se observaron reacciones como hipersalivación, signos neurológicos reversibles (hiperestesia, depresión, signos nerviosos) o vómitos.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LACTANCIA O LA PUESTA:

Los estudios toxicológicos con fipronilo no han demostrado efectos teratogénicos ni embriotóxicos. No se han llevado a cabo estudios con este medicamento en hembras gestantes ni lactantes. El uso durante la gestación y la lactancia debe condicionarse a la recomendación del veterinario responsable tras la valoración beneficio/riesgo.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Ninguna conocida.

SOBREDOSIFICACIÓN (SÍNTOMAS, MEDIDAS DE URGENCIA, ANTÍDOTOS) EN CASO NECESARIO: No se observaron reacciones adversas en la especie de destino en los estudios de seguridad realizados en gatos y cachorros de 2 meses de edad y mayores, con un peso aproximado de 1 kg y tratados con una dosis 5 veces mayor a la dosis recomendada durante 3 meses consecutivos.

El tiempo de reacciones adversas puede aumentar en casos de sobredosis.

TIEMPO DE ESPERA: No procede.

INCOMPATIBILIDADES: Ninguna conocida.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN: No conservar a temperatura superior a los 25°C. Conservar en un lugar seco. Conservar en el envase original.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. El fipronilo puede afectar de forma adversa a los organismos acuáticos. No se deben contaminar estanques, vías fluviales o acequias con el medicamento ni con el envase vacío.

NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 2564 ESP.

PROHIBICIÓN DE VENTA, DISPENSACIÓN Y/O USO:

Condiciones de dispensación: **Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.**

EN CASO DE DUDA CONSULTE A SU VETERINARIO.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

REPRESENTANTE DEL TITULAR:

Laboratorios Zotal S.L.U.

Ctra. Nacional 630, km. 809.

41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA

Tel.: +34 954 390 204

Email: zotal@zotal.com www.zotal.com

INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297

