



BROTE DE VIRUS SHAMONDA EN ESPAÑA

El virus Shamonda (SHAV) es un virus del género *Orthobunyavirus* transmitido principalmente por dípteros hematófagos del género *Culicoides* (jejenes). Está estrechamente relacionado con otros virus del serogrupo Simbu, como el virus de Schmallenberg (SBV) y el virus de Akabane (AKAV). Desde el verano de 2026 se ha detectado en Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Jersey) y Suiza.

El Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia, ha confirmado la detección del virus Shamonda en explotaciones de ganado bovino de varias provincias, en el marco de la vigilancia pasiva. Las explotaciones afectadas han presentado una sintomatología compatible con la descrita en otros países europeos: principalmente fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea.

A 22 de octubre de 2026, el virus se ha confirmado en las siguientes provincias:

- **Shamonda tipo 1:** Córdoba, Toledo, Ávila, Madrid y Girona (en esta última, tres explotaciones de vacuno de leche confirmadas el 20 de octubre).
- **Shamonda tipo 2:** Cantabria.


Actualmente el virus Shamonda no es una enfermedad de declaración obligatoria, aunque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) mantiene la vigilancia y la situación de alerta. Ante cualquier sospecha clínica, contacte con su veterinario.

Se puede encontrar más información sobre la enfermedad en la página:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/virus_shamonda/virus_shamonda



VECTOR
(*Culicoides*)



ACTUALIZACIÓN SANITARIA | FRANCIA

Francia ha notificado el fallecimiento, a principios de octubre, de un paciente gravemente inmunodeprimido infectado por el virus Shamonda.

Es la primera infección humana descrita. Las autoridades sanitarias investigan la relación entre la infección y el fallecimiento, y no han identificado riesgo para la población general. No se conoce transmisión entre personas.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

El periodo de incubación del virus Shamonda no está establecido; por analogía con el virus de Schmallenberg, se estima de pocos días.

En el ganado bovino, las infecciones agudas cursan principalmente con fiebre, diarrea y disminución de la producción de leche, de entre un 10 y un 20 % durante 7-10 días.

La morbilidad puede ser muy elevada, llegando a afectar hasta al 100 % de la explotación, si bien la mayoría de los animales adultos se recuperan. Hasta el momento no se ha observado mortalidad atribuible directamente al virus.



En las explotaciones afectadas de Suiza se ha descrito una duración aproximada del episodio clínico de 14 a 21 días.

También se han descrito repercusiones reproductivas en hembras gestantes, ya que el virus puede atravesar la placenta e infectar al feto, y ocasionar abortos o malformaciones fetales graves.

Otras especies son susceptibles a la infección, como el ovino y el caprino (generalmente sin clínica aparente, aunque se han descrito malformaciones congénitas en corderos) y los équidos (en los que se han descrito signos neurológicos, sin que se haya demostrado su causalidad por el momento).

PREVENCIÓN Y CONTROL

Por el momento no existe ninguna vacuna frente al virus Shamonda, por lo que la prevención y el control se basan en las medidas frente al vector *Culicoides*, entre ellas el uso de repelentes y desinsectantes, junto con el tratamiento veterinario sintomático de los animales afectados.

Los *Culicoides* se crían en materia orgánica húmeda (estiércol, barro y bordes de charcas) y son más activos al amanecer y al atardecer. Se recomienda mantener limpias y secas las zonas alrededor de abrevaderos y estercoleros y, en la medida de lo posible, estabular a los animales en esas horas.

PRODUCTOS ZOTAL PARA EL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES

REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN DE INSECTOS EN LAS INSTALACIONES

Para reducir la población de insectos voladores en establos, naves y su entorno, Zotal dispone de los insecticidas ARPON® G, ARPON® Diazipol, ARPON® Destroyer y ARPON® Diptron. Se aplican sobre las superficies donde reposan los insectos (paredes, techos y zonas de sombra), conforme a las dosis y condiciones de uso de su etiqueta. Estos productos se aplican sobre el entorno, nunca directamente sobre los animales.

REPELENCIA SOBRE EL ANIMAL

Para repeler los insectos del propio animal, Zotal dispone del repelente Parasital Zero, de aplicación directa sobre el ganado bovino. Se recomienda prestar especial atención a las horas de mayor actividad de los insectos (amanecer y atardecer) y renovar la aplicación con la frecuencia que indique su etiqueta.

El uso de insecticidas y repelentes forma parte del control integrado de insectos, junto con la limpieza de los lugares de cría y el manejo de los animales.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Para obtener más información puede consultar nuestra web:

zotal.com